

# ◎第95回必修問題一覧◎

【問題1】平成14年の男性の悪性新生物死亡数で最も多い部位はどれか。

1. 肺
2. 胃
3. 肝
4. 大腸

【問題2】サーカディアンリズムの周期はどれか。

1. 90分
2. 12時間
3. 24時間
4. 28日

【問題3】医療保険制度で正しいのはどれか。

1. 健康診断は給付対象外である。
2. 高額療養費は医療給付に含まれない。
3. 国民健康保険の保険者は国である。
4. 医療給付は現金給付が原則である。

【問題4】保健師助産師看護師法に定められている看護師の義務はどれか。

1. 関係機関との連携
2. 記録の保存
3. 結果発生の予見
4. 秘密の保持

【問題5】自分の可能性を最高に発揮したいと願う社会的欲求はどれか。

1. 承認
2. 愛と帰属
3. 自尊
4. 自己実現

【問題6】キューブラ・ロスによる死にゆく人の心理過程で第1段階はどれか。

1. 死なねばならないことへの怒り
2. 延命のための取り引き
3. 死を認めようとしなない否認
4. 死の恐怖や不安による抑うつ

【問題7】日本版デンバー式発達スクリーニング検査で90%の乳児の首がすわる月齢基準はどれか。

1. 2か月
2. 4か月
3. 6か月
4. 8か月

【問題8】乳歯がはえそろう時期はどれか。

1. 1歳6か月
2. 2歳6か月
3. 3歳6か月
4. 4歳6か月

【問題9】地域保健法に基づく保健所の事業で誤っているのはどれか。

1. 環境衛生
2. 健康増進
3. 疾病予防
4. 要介護認定

**【問題10】** 交感神経の緊張状態はどれか。

1. 瞳孔の収縮    2. 気管支の収縮    3. 心拍数の減少    4. 末梢血管の収縮

**【問題11】** 部位と流れる血液との組合せで正しいのはどれか。

1. 肺動脈 —— 動脈血    2. 肺静脈 —— 静脈血  
3. 右心房 —— 動脈血    4. 左心室 —— 動脈血

**【問題12】** 水欠乏性脱水で低下するのはどれか。

1. 尿量    2. 尿比重    3. 血漿浸透圧    4. 血清ナトリウム値

**【問題13】** 黄疸を最も認めやすい部位はどれか。

1. 眼球結膜    2. 爪床    3. 口唇    4. 耳朶

**【問題14】** 電気的除細動の適応となる不整脈はどれか。

1. 期外収縮    2. 心室細動    3. 脚ブロック    4. 房室ブロック

**【問題15】** 成人の1日の尿量で乏尿と判断する基準はどれか。

1. 100ml以下    2. 200ml以下    3. 400ml以下    4. 600ml以下

**【問題16】** 動脈硬化に最も関連のある危険因子はどれか。

1. 胆石症    2. 尿管結石    3. 高脂血症    4. 高尿酸血症

**【問題17】** 開放骨折で正しいのはどれか。

1. 複数の骨が同時に折れている。    2. 複雑な折れ方をしている。  
3. 骨折部が外界と交通している。    4. 骨片の転位を起こしていない。

**【問題18】** 抑うつ状態でみられるのはどれか。

1. 無気力    2. せん妄    3. 徘徊    4. 幻覚

**【問題19】** 副腎皮質ステロイド薬の長期投与による有害作用はどれか。

1. 骨粗鬆症    2. 血圧低下    3. 聴力障害    4. 低血糖

**【問題20】** ワルファリンカリウム服用時に避けた方がよい食品はどれか。

1. 緑茶    2. 納豆    3. チーズ    4. グレープフルーツ

**【問題21】** 成人で高血圧と判断するのはどれか。

1. 136/84mmHg    2. 134/86mmHg  
3. 124/88mmHg    4. 122/92mmHg

**【問題22】** 浣腸施行に適しているのはどれか。

1. 腹臥位    2. 右側臥位    3. 左側臥位    4. ファウラー位

【問題23】 右片麻痺患者の寝衣交換で正しいのはどれか。

1. 右から脱がせ、右から着せる。
2. 右から脱がせ、左から着せる。
3. 左から脱がせ、右から着せる。
4. 左から脱がせ、左から着せる。

【問題24】 仙骨部にある褥瘡のケアで適切なのはどれか。

1. 仙骨部への円座使用
2. 褥瘡部のマッサージ
3. 45度半坐位の保持
4. 体圧分散寝具の使用

【問題25】 インスリン製剤の投与量を表すのはどれか。

1. 単位 (U)
2. モル (mol)
3. マイクログラム ( $\mu\text{g}$ )
4. ミリグラム当量 (mEq)

【問題26】 滅菌手袋を使用しなければならないのはどれか。


1. 口腔ケア
2. 陰部洗浄
3. ストーマ装具の交換
4. 導尿

【問題27】 鎖骨下静脈へ中心静脈カテーテルを挿入する際に起こりやすい合併症はどれか。

1. 肺炎
2. 気胸
3. 嘔吐
4. 無気肺

【問題28】 右図の三方活栓で、薬液の流れはどれか。

1. A液のみ注入
2. B液のみ注入
3. A液、B液ともに注入
4. A液、B液ともに中断



【問題29】 酸素ボンベ内の残量を確認する方法はどれか。

1. バルブを開けた時の噴出音
2. 圧力計の示す値
3. 加湿ビン内の気泡の量
4. 酸素流量計の目盛

【問題30】 前腕の動脈性外出血の止血で正しいのはどれか。

1. 出血部より末梢側を圧迫する。
2. 圧迫部位を心臓より高く保つ。
3. 直接圧迫は2～3分行う。
4. 止血帯は90分以上連続して使用する