

[問題1]日本の人口で正しいのはどれか。

1. 女性より男性が多い。
2. 総人口は約3億人である。
3. 生産年齢人口は減少傾向である。
4. 人口ピラミッドはつりがね型である。

[問題2]日本における平成30年(2018年)の部位別にみた悪性新生物の死亡数で、女性で最も多い部位はどれか。

1. 胃
2. 膵臓
3. 乳房
4. 大腸

[問題3]平成29年(2017年)の患者調査における外来受療率が最も多い疾患はどれか。

1. 神経系の疾患
2. 消化器系の疾患
3. 呼吸器系の疾患
4. 循環器系の疾患

[問題4]健康日本21(第二次)をふまえて策定された日本人の食事摂取基準(2020年版)で、男性(18歳以上)のナトリウム(食塩相当量)の摂取目標量はどれか。

1. 5.5g/日未満
2. 6.5g/日未満
3. 7.5g/日未満
4. 8.5g/日未満

[問題5] ストレス下で分泌されるホルモンはどれか。

1. パラソルモン
2. プロゲステロン
3. ノルアドレナリン
4. エリスロポエチン

[問題6] 介護保険法で定める特定疾病に該当するのはどれか。

1. 早期胃癌
2. 重症筋無力症
3. 慢性閉塞性肺疾患
4. ギラン・バレー症候群

[問題7] 尊厳死の意思表示書をあらわすのはどれか。

1. アドヒアランス
2. パターナリズム
3. リビングウィル
4. コンプライアンス

[問題8] 小泉門が閉鎖する時期はどれか。

1. 生後2～3か月
2. 生後6～7か月
3. 生後9～10か月
4. 生後11～12か月

[問題9] 生後6か月の乳児の発達を評価するのはどれか。

1. 首がすわる。
2. 寝返りをうつ。
3. お座りをする。
4. ひとり立ちをする。

[問題 10]学童期の発達危機はどれか。

1. 空の巣症候群
2. ワーカホリック
3. ギャングエイジ
4. サンドイッチ症候群

[問題 11]女性の更年期で分泌が低下するのはどれか。

1. エストロゲン
2. アンドロゲン
3. バソプレシン
4. エリスロポエチン

[問題 12]老年期に衰えやすい機能はどれか。 **2つ選べ。**

1. 持久力
2. 想起力
3. 統合力
4. 洞察力
5. 判断力

[問題 13]前頭葉にあるのはどれか。

1. 感覚野
2. 視覚野
3. ブローカ野
4. ウェルニッケ野

[問題 14]血漿タンパク質はどれか。

1. カリウム
2. アルブミン
3. ヘモグロビン
4. マクロファージ

[問題 15]炭水化物 1 g が体内で代謝されたときに生じるエネルギー量はどれか。

1. 4kcal
2. 9kcal
3. 14kcal
4. 19kcal

[問題 16]血中クレアチニンによって主に評価されるのはどれか。

1. 心機能
2. 腎機能
3. 呼吸機能
4. 認知機能

[問題 17]水欠乏性脱水で増加するのはどれか。

1. 血 圧
2. 脈 拍
3. 尿 量
4. 発汗量

[問題 18]弛緩性便秘の原因はどれか。

1. ストレス
2. 便意の抑制
3. 下剤過剰摂取
4. 食物繊維不足

[問題 19]尿量が異常に多い状態をあらわすのはどれか。

1. 多 尿
2. 尿 閉
3. 頻 尿
4. 尿失禁

[問題 20] うつ病でみられやすい妄想はどれか。

1. 被害妄想
2. 誇大妄想
3. 微小妄想
4. 注察妄想

[問題 21] 生活習慣病の二次予防はどれか。

1. 禁煙する。
2. 健診を受ける。
3. 予防接種を受ける。
4. リハビリテーションをする。

[問題 22] 細菌が原因で発症するのはどれか。

1. 麻疹
2. 百日咳
3. COVID-19
4. 伝染性紅斑

[問題 23] 抗ウイルス薬はどれか。

1. ペニシリン
2. ザナミビル
3. シスプラチン
4. ストレプトマイシン

[問題 24] ワルファリン服用時に避ける必要があるのはどれか。

1. 牛乳
2. 納豆
3. 昆布
4. チーズ
5. グレープフルーツ

[問題 25] 腹部の観察で最初におこなうのはどれか。

1. 打 診
2. 聴 診
3. 視 診
4. 触 診

[問題 26] 成人女性に導尿をおこなう際のカテーテル挿入の長さはどれか。

1. 1～3 cm
2. 4～6 cm
3. 7～10cm
4. 11～14cm